




# Vademécum Mascotas



**A la Vanguardia de la salud animal**



**California**<sup>®</sup>

**A la Vanguardia de la salud animal**



## Marboquin®

**Tabletas ranuradas de Marbofloxacina y solución inyectable**  
**Antibacteriano bactericida sintético de amplio espectro**  
**Quinolona potenciada en cinética y espectro**

**Composición:**

Marboquin 5  
 Cada tableta contiene:  
 Marbofloxacina..... 5 mg  
 Excipientes c.s.p ..... 1 Tableta

Marboquin 25  
 Cada tableta contiene:  
 Marbofloxacina..... 25 mg  
 Excipientes c.s.p ..... 1 Tableta

Marboquin 50  
 Cada tableta contiene:  
 Marbofloxacina..... 50 mg  
 Excipientes c.s.p ..... 1 Tableta

Marboquin Solución Inyectable  
 Cada mL contiene:  
 Marbofloxacina..... 100 mg  
 Excipientes ..... 1 mL

Indicación	Duración del tratamiento	Según la evolución
Pioderma superficial y grave	10-20 días respectivamente.	Máx. 40 días
Infecciones del tracto urinario	Mínimo 10 días	28 días (prostatitis o epididimitis)
Infecciones respiratorias	Mínimo 7 días	21 días

**Gatos:** Frecuencia de administración según la patología y la evolución del paciente:

Indicación	Duración del tratamiento
Infecciones de piel y tejidos blandos	3 a 5 días
Infecciones del tracto respiratorio	5 días

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** En perros y gatos 2.5 – 5.5 mg/kg/día. En la práctica administrar vía oral 1 tableta de 5 mg por cada 0,9 a 2 kg de peso, 1 tableta de 25 mg por cada 4.5 a 10 kg de peso, 1 tableta de 50 mg por cada 9 a 20 kg de peso, solución inyectable aplicar por vía I.M., S.C, de 0,25 – 0,5 mL por cada 10 kg de peso.

**Perros:** Frecuencia de administración según la patología y la evolución del paciente:

**PRESENTACIÓN:** Frasco x 10 tabletas ranuradas de 5, 25 y 50 mg, caja x 3 sobres x 10 tabletas cada uno, de 25 y 50 mg. Solución inyectable viales x 10 mL  
 Registró ICA N° 9930-MV (5 mg), 9463-MV (25 mg) y 9464-MV (50 mg)  
 Registro ICA No: 10149 - MV (10%)



## Descensor®-Vet

**Tabletas ranuradas de Doxiciclina**  
**Antibiótico de amplio espectro y efecto inmunomodulador**  
**Tetraciclina mejorada en absorción, espectro y como antidegradante tisular**

**COMPOSICIÓN:** Cada tableta contiene:  
 Doxiciclina Hiclato ..... 200 mg  
 Excipientes c.s.p ..... 1 Tableta

**INDICACIONES:** Tratamiento de Ehrlichiosis canina, infecciones del tracto respiratorio y urinario, piodermas superficiales y profundos, infecciones buco-dentarias en perros y gatos, y enfermedades de origen infecciosas causadas por bacterias Gram (+), Gram (-), Mycoplasmas, Rickettsias y Espiroquetas.

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Perros y Gatos: 10 mg/kg vía oral cada 24 horas durante 3 a 5 días en afecciones agudas y subagudas, y hasta por 10 días en afecciones crónicas; la dosis puede ajustarse a 15 mg/kg. En la práctica: 1 tableta/20 kg.

- Ehrlichiosis canis: Tratamientos de 28-30 días
- Haemobartonelosis: 1 tableta/20 kg de peso cada 8 horas durante 2 semanas.
- Leptospirosis: tratamiento 2 veces al día por 14 días

**PRESENTACIÓN:** Caja con 1 sobre por 30 tabletas.  
 Registro ICA No 7225 – MV



## Quinocalf®



Solución inyectable, Solución oral en gotero,  
Tabletas de Enrofloxacin  
**Máximo espectro bactericida a la hora de atacar las infecciones**

### COMPOSICIÓN:

Quinocalf Solución Inyectable  
Cada mL contiene:  
Enrofloxacin..... 50 mg  
Excipientes ..... 1 mL

Quinocalf Solución Oral:  
Cada mL contiene:  
Enrofloxacin..... 100 mg  
Excipientes ..... 1 mL

Quinocalf Tabletas  
Cada tableta contiene:  
Enrofloxacin..... 25 mg  
Excipientes ..... 1tableta

**INDICACIONES:** En perros, gatos y aves para el tratamiento y control de infecciones del tracto digestivo, respiratorio, genitourinario, en heridas de piel y tejidos blandos.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Aves: A dosis de 10 mg/kg de peso. En la práctica administrar QUINOCALF 10% solución oral 0.1 mL/kg, equivalente a 2 gotas por kg de peso. Perros y gatos: A dosis de 5 mg/kg de peso. En la práctica administrar QUINOCALF 10% solución oral 0.25 mL por cada 5 kg, equivalente a 5 gotas por cada 5 kg de peso de 1 a 2 veces al día, durante 3 - 5 días. QUINOCALF Tabletas administrar 1 tableta por cada 5 kg de peso 1 a 2 veces al día durante 3 - 5 días. QUINOCALF inyectable al 5% aplicar 0,5 mL vía Subcutanea por cada 5 kg de 1 a 2 veces al día durante 3 - 5 días.

**PRESENTACIÓN.** Frasco por 10, 50 y 100 mL. Caja por 3 y 5 frascos de 10 mL  
Registró ICA N° 2949 DB, Frascos gotero por 10 mL, caja x 12 frascos.  
Registró ICA N° 3251-DB, Caja con 50 Blister x 10 Tabletas por 25 mg.  
Registró ICA N° 3926DB



## Analgésicos, Antiinflamatorios y Antialérgico

## Desinflamon®



Solución inyectable de Betametasona sódica  
Glucocorticoide de acción antiinflamatoria, antialérgica, antishock

**Antiinflamatorio, antialérgico, antishock de emergencia sin afectar la inmunidad**

### COMPOSICIÓN:

Cada mL de solución inyectable contiene  
Betametasona sódica ..... 2 mg  
Excipientes c.s.p ..... 1 mL

**INDICACIONES:** En bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y gatos para tratamiento de condiciones inflamatorias no infecciosas de las articulaciones y tejidos relacionados. Como coadyuvante en afecciones de tipo alérgico e inflamatorio de etiología no infecciosa.

**DOSIFICACIÓN:** Administrar por vía intramuscular o intravenosa en caso necesario.

Especie	Dosis	En la practica
Caninos	0,25-1 mg/kg	0,1 mL - 0,5 mL
Gatos	0,25-0,5 mg/kg	0,1 mL - 0,3 mL

No suspender abruptamente el tratamiento de frecuencia prolongada, realizar protocolos de disminución gradual y la administración en días alternos según el caso en particular.

**PRESENTACIÓN:** Frascos por 10, 20 mL.  
Caja por 3 y 5 frascos de 10 mL. Registró ICA N° 3779-DB



## Galgocal® 200-600

Tabletas ranuradas Albendazol+ Praziquantel

Antihelmíntico y giardicida oral de amplio espectro para perros y gatos.

**Protección antiparasitaria integral de la mascota y de la familia**

### COMPOSICIÓN:

GALGOICAL® 200 Cada tableta contiene:  
 Albendazol micronizado..... 200 mg  
 Praziquantel..... 30 mg  
 Excipientes c.s.p..... 1 tableta

GALGOICAL® 600 Cada tableta contiene:  
 Albendazol micronizado..... 600 mg  
 Praziquantel..... 100 mg  
 Excipientes c.s.p..... 1 tableta

**INDICACIONES:** Perros y gatos: Tratamiento del parasitismo producido por Nematodos, Trematodos, Cestodos y Giardia Sp.

**DOSIFICACIÓN:** Administración vía oral, en una sola dosis.

Dosis básica: Albendazol 30 mg/kg, Praziquantel 5 mg/kg.

En la Práctica: GALGOICAL® 200: 1 Tableta/6 kg.

GALGOICAL® 600: 1 Tableta/20 kg.

Para giardiosis: administrarlo, por 2 días en perros y por 5 días en gatos.

**PRESENTACIÓN:** Caja de 30 sobres, con 2 tabletas.

Registró ICA. GALGOICAL® 200 N°4854-DB

GALGOICAL® 600 N° 4853-DB



## Coccicalf® 5%

Suspensión oral Toltrazuril

Coccidicida de amplio espectro en perros y gatos

**Único de dosis única en programas profilácticos, metafilácticos y curativos de las coccidiosis**

**COMPOSICIÓN:** Cada mL de suspensión contiene:

Toltrazuril ..... 50 mg  
 Excipientes c.s.p ..... 1 mL

**INDICACIONES:** Para el tratamiento y control de la coccidiosis en todas las fases del desarrollo parasitario en perros y gatos

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Administración vía oral

Especie	Dosis	En la Práctica	Observaciones
Perros	10-20 mg/kg	1 mL (20 gotas)/2,5 kg 20 mg/kg dosis única.	Cachorros: 15 días de vida Criaderos: repetir a los 7 o 14 días.
Gatos	10 mg/kg	1 mL (20 gotas) /5 kg	Durante 2 días.

**PRESENTACIÓN:** Jeringa por 15 mL. Frasco por 120, 500 y 1000 mL.

Caja por 12 frascos por 10 mL. Registró ICA N° 7570-MV



## Saniderm®

Crema tópica (Gentamicina, Clotrimazol, Betametasona, Óxido de Zinc)

Antimicótico, antibacteriano, antiinflamatorio, anti-pruriginoso y cicatrizante

**Protege integralmente la primera barrera de defensa; la piel**

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g de crema tópica contiene:

Gentamicina (Gentamicina sulfato) .....	0,10 g
Clotrimazol .....	1,00 g
Betametasona (Betametasona sódica fosfatada) .....	0,05 g
Óxido de Zinc .....	5,00 g
Excipientes c.s.p .....	100 g

**INDICACIONES:** Antimicótico, antiinflamatorio, anti pruriginoso, cicatrizante y antibacteriano para el tratamiento de enfermedades de la piel en todas las especies domésticas

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Uso externo. Aplicar SANIDERM® Crema sobre la región afectada de la piel, suficiente cantidad, distribuyéndola uniformemente, 2 ó más veces al día hasta obtener mejoría.

**PRESENTACIÓN:** Tubo colapsible por 40 g. Tarro x 200 g. Registró ICA N° 4321-DB



## Mikomax®

Tabletas ranuradas Ketoconazol 200 mg  
Antimicótico oral de amplio espectro

**Antimicótico superficial y profundo en terapias extendidas**

**COMPOSICIÓN:** Cada tableta contiene

Ketoconazol .....	200 mg
Excipientes c.s.p .....	1 tableta

**INDICACIONES:** En perros y gatos para el tratamiento de micosis, dermatitis y otitis en perros y gatos, causadas por *Malassezia pachydermatis*, *Sporothrix Schenckii*, *Microsporum canis*, *Trichophyton mentagrophytes* y *Microsporum gypseum*.

**DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Administración por vía oral

Dermatomycosis (Hongos superficiales)	Perros	5-10 mg/kg día, durante 4 a 6 semanas. En la práctica: ½ a 1 tableta/20 kg
	Gatos	5-10 mg/kg día, durante 4 a 6 semanas. En la práctica: ¼ de tableta/5 kg.
Micosis sistémicas (Hongos profundos)	Perros	10 mg/kg 3 veces al día. En la práctica: 1 tableta/20 kg cada 8 hrs x 6 semanas.
	Gatos	20 mg/kg 2 veces al día en días alternos, o 10 mg/kg/día. En la práctica: ½tableta /5 kg cada 12 hrs día de por medio, o ¼ Tableta/ 5 kg/día por 6 semanas.

**PRESENTACIÓN:** Caja por 1 blíster con 10 tabletas. Registró ICA N° 6736-MV



## Sedolax® Vet

Solución oral, Solución inyectable de Metoclopramida

**Antiemético y gastrocinético que normaliza las funciones digestivas**

### COMPOSICIÓN:

Sedolax Solución Oral contiene:  
Metoclopramida..... 5 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 mL

Sedolax Solución inyectable contiene:  
Metoclopramida..... 5 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 mL

**INDICACIONES:** Perros y gatos como coadyuvante en el tratamiento de vómitos de diferente origen. Útil en náuseas, reflujo por esofagitis e intolerancia gástrica, vaciado gástrico y preparación de animales para estudios radiológicos del tracto digestivo y endoscopia.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** 0.5 mg/kg vía oral, cada 8 horas. En la práctica: 1 mL (20 gotas)/10 kg o 2 gotas/kg de peso. vía IV, IM o SC, cada 8 horas. En la práctica: 1 mL/10 kg. Puede administrarse 1-2 mg/kg como infusión intravenosa constante durante 24 horas.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero por 10 mL en caja individual. Registró ICA N° 6792-MV.  
Frasco de vidrio por 10 ml en caja individual.  
Caja por 3 y 5 frascos de 10 mL. Registró ICA N° 6806-MV.



## Antidiarreico

## Quinodiar®

Suspensión oral de Enrofloxacin, Caolín y Pectina

Antidiarreico y antibacteriano

**Máxima protección a la hora de atacar las infecciones digestivas**

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de suspensión oral contiene  
Enrofloxacin ..... 2,5 g  
Caolín ..... 20 g  
Pectina ..... 2 g  
Excipientes c.s.p ..... 100 mL.

**INDICACIONES:** En perros y gatos para el tratamiento de las afecciones del tracto gastrointestinal como enteritis, gastroenteritis, gastritis, diarrea aguda en los terneros, intoxicación bacteriana.

### DOSIFICACIÓN:

Especie	Dosis	En la práctica
Perros y gatos	5 mg de enrofloxacin por kg durante 3 – 5 días.	1 mL /5 kg vía oral, diariamente

**PRESENTACIÓN:** Frasco x 30 y 60 mL. Registró ICA N° 5159-DB.



## Quercetol®-Vet

Solución inyectable y Tabletas

**Único hemostático madurador de plaquetas, antioxidante, antiinflamatorio y angioprotector**

### COMPOSICIÓN:

Quercetol Solución Inyectable cada mL contiene:

Etamsilato..... 125 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 mL

Quercetol Vet Tabletas 100 mg  
cada tableta contiene:  
Etamsilato..... 100 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

Quercetol Vet Tabletas 70  
cada tableta contiene:  
Etamsilato..... 70 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

**INDICACIONES:** En perros y gatos como coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas. Para control de hemorragia durante procedimientos quirúrgicos, aplicar 15 a 30 minutos antes

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Administración intravenosa o intramuscular

QUERCETOL®- VET tabletas 70 mg			QUERCETOL®- VET tabletas 100 mg		
Peso de perro y gato kg	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura	Peso de perro kg	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura
5	1/2	1	10	1/2	1
10	1	2	15	1	2
			20	1	2 y 1/2
			25	1 y 1/2	3
			30	2	3 y 1/2
			40	2 y 1/2	5

**PRESENTACIÓN:** Frasco inyectable por 10 mL. Caja por 3 y 5 frascos de 10 mL. Registró ICA N° 7013-MV, Caja por blíster x 10 tabletas ranuradas x 70 mg y 100 mg. Registró ICA N° 9849-MV y 9848-MV.



## Ótico-Oftálmico

## Ojux®-V

**Solución ótico-oftálmico Gentamicina, Betametasona, Lidocaína**  
**Ótico oftálmico antiinflamatorio, analgésico, antibacteriano, anestésico, antipruriginoso y descongestionante**

**Asocia múltiples acciones para oír y ver**

### COMPOSICIÓN:

Cada mL de solución contiene  
Lidocaína clorhidrato ..... 5 mg  
Betametasona sodio fosfato ..... 1,3 mg  
Gentamicina (sulfato) ..... 3 mg  
Excipientes c.s.p ..... 1 mL

**INDICACIONES:** Tratamiento de afecciones de oídos y ojos en caninos, felinos y demás animales domésticos. Indicado en otitis externa y del oído medio, blefaritis, queratoconjuntivitis, causadas por bacterias sensibles a la Gentamicina. Coadyuvante en el tratamiento del entropión, distiquiasis, protrusión ocular y otras patologías y traumatismos que requieren corrección quirúrgica. En post-operatorios de ojo y de oído.

### DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Perros y gatos:

-En el ojo afectado, instilar 1 o 2 gotas de OJUX®- V, dos a tres veces al día hasta la desaparición de los síntomas.

-En otitis y previa limpieza del pabellón de la oreja, aplicar 4 a 5 gotas de OJUX®- V en el oído afectado, dos o tres veces al día hasta la desaparición de los síntomas.

### PRESENTACIÓN:

Frasco gotero por 10 mL.  
Registró ICA N° 5886-DB



## Bonavit®



Suspensión oral Calcio, Fosforo, Vitaminas A y D y del complejo B

**Balance óptimo de nutrientes para crecer con huesos fuertes y sanos**

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de Suspensión contiene

Calcio (mínimo) asimilable	....10,41%
Fosforo (mínimo) asimilable	... 5,9%
Vitamina D3	..... 5000 UI
Vitamina A	..... 50000 UI
Vitamina B1	..... 600 µg
Vitamina B2	..... 2,5 mg
Vitamina B6	..... 4 mg
Vitamina B12	..... 30 µg
Niacinamida	..... 10 mg
Flúor (máximo)	..... 0,05 %
Excipientes c.s.p	..... 100 mL

**INDICACIONES:** Fuente altamente concentrado de Calcio y Fósforo con Vitaminas A, D3 y Vitaminas del Complejo B. Especial para usar en animales en crecimiento: cachorros, potros, terneros y lechones. También para hembras lactantes.

**DOSIFICACIÓN:** Diariamente, por vía oral, en las siguientes cantidades:

Especie	Dosis	Observación
Gatos	5 mL (1 cucharadita) por día	Se puede mezclar con lactoreemplazadores
Perros	10 mL/5 kg de peso por día (1 cucharada sopera)	

**PRESENTACION:** Frasco por 120, 250 y 500 mL. Registró ICA N° 6374- SL.



## Cardiovascular

## Cardio B®



Tabletas ranuradas Benazepril HCl  
Cardio protector y antihipertensivo IECA

**Cardioprotector, para que la vida no se detenga**

**COMPOSICIÓN:** Cada tableta recubierta contiene

Benazepril base (HCl)	..... 5 mg
Excipientes c.s.p	..... 1 Tableta

**INDICACIONES:** Antihipertensivo de la clase IECA (inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina) para el tratamiento de cardiopatías y enfermedades renales en perros y gatos.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Perros:** Administrar vía oral a una dosis médica de 0.25 – 0.5 mg /kg. En la práctica administrar ½ a 1 tableta de Cardio B por cada 5 – 10 kg cada 24 horas.

Peso del perro (kg)	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura
5	½ tableta	½ tableta
10	½ tableta	1 tableta
15	1 tableta	1 y ½ tabletas
20	1 tableta	2 tabletas

**Gatos:** Administrar vía oral a una dosis médica de 0.5 – 1.0 mg /kg. En la práctica administrar ½ a 1 tableta de Cardio B por cada 2.5 – 5 kg cada 24 horas

Peso del gato (kg)	Cantidad mínima efectiva	Cantidad máxima segura
2.5	½ tableta	½ tableta
5.0	½ tableta	1 tableta
7.5	1 tableta	1 y ½ tabletas

**PRESENTACIÓN:** Caja plegadiza por 30 tabletas recubiertas en blíster por 10 tabletas. Registró ICA N° 9925-mv



## Cardio B+E®

Tabletas ranuradas y recubiertas

**Cardio protector y antihipertensivo IECA de acción multimodal**

**Cardioprotector multimodal, para que la vida no se detenga**

**COMPOSICIÓN:** cada tableta recubierta contiene:

CARDIO B + E 5/40	CARDIO B + E 10/80
Benazepril base (HCl) ..... 5 mg.	Benazepril base (HCl) ..... 10 mg.
Espironolactona ..... 40 mg.	Espironolactona ..... 80 mg.
Excipientes c.s.p.....1 tableta	Excipientes c.s.p.....1 tableta

**INDICACIONES:** En perros para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva, causada por la enfermedad valvular degenerativa crónica canina y la dilatación cardiaca.

**DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Perros:**

La dosis corresponde a 0,25-0,5 mg de clorhidrato de Benazepril / kg p.v. y Espironolactona 2-4 mg/kg p.v. Se debe administrar por vía oral una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Esta dosis corresponde, según la tabla siguiente:

CARDIO B + E 5/40		CARDIO B + E 10/80	
Peso del perro (kg)	Cantidad	Peso del perro (kg)	Cantidad
5 - 10	1/2 tableta	10 - 20	1/2 tableta
10 - 20	1 tableta	20 - 40	1 tableta

Si se considera necesario empezar con la dosis baja recomendada y se ajusta de acuerdo con la respuesta clínica y al criterio del Médico Veterinario.

**Presentación:** Caja por 30 tabletas recubiertas. Registró ICA N° 10340-MV. Registró ICA N° 10341-MV.



## Baños Antiparasitarios

### Bañol® 12.5%

**Solución emulsificable Amitraz**

**Garrapaticida y acaricida selectivo para perros**  
**Acaba con seguridad las garrapatas, las tumba y las mata**

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL de solución contiene

Amitraz .....	12,5 g
Excipientes c.s.p .....	100 mL

**INDICACIONES:** En perros para el tratamiento de sarna demodéica (Demodex canis), sarcóptica (Sarcoptes scabiei var canis) y para el control de garrapata del perro (Rhipicephalus sanguineus).

**DOSIFICACIÓN:**

Indicación	Dosis	Frecuencia
Garrapatas y sarna	2 mL en 1L de agua (250 ppm)	Cada 20 días Fumigar instalación y cama con el sobrante
Sarna	3 mL en 1L de agua(375 ppm)	3-4 tratamientos, cada 10-14 días

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III:** Medianamente tóxico.

**PRESENTACION:** Caja por 12 frascos por 33 mL. Frascos por 100 mL, 500 mL y 1000 mL. Registró ICA N° 3313-DB.



## Moskofin® CIK

Polvo listo para uso Cipermetrina, Citronella, Aceite de pino, Ftalato

Insecticida, arácnida y formicida para instalaciones pecuarias

**A insectos y arácnidos pone fin**

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g de polvo contienen

Cipermetrina ..... 5 g  
Excipientes c.s.p..... 100 g

**INDICACIONES:** Insecticida de uso en instalaciones pecuarias, hogares, criaderos, perreras, plazas de mercado.

**DOSIFICACIÓN:** Aplicación por espolvoreo manual o equipos de dispersión, sobre paredes, techos, pisos en instalaciones pecuarias sin animales (galpones, establos, criaderos, apriscos), y/o en instalaciones no pecuarias (hogares, plazas, etc), utilizando 5 g por metro cuadrado de superficie. Aplicar luego de la evacuación de los animales, de la limpieza y desinfección de las instalaciones y al momento del cambio de camas. Ingresar animales 24 horas después del tratamiento.

**PRECAUCIÓN: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III:** Medianamente Tóxico. No aplicar directamente sobre animales. Mantenga alejado de productos destinados a alimentación. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACION:** Caja por 50 sobres 15 g. Registró ICA N° 7492-MV.





## Quinocalf®

Enrofloxacin

Antibacteriano bactericida de amplio espectro



## Descensor® Vet

Doxiciclina 200 mg

Antibiótico de amplio espectro y efecto inmunomodulador.



## Quercetol® Vet

Etamsilato 12,5%

Hemostático, angioprotector, antiinflamatorio y madurador de plaquetas



## Galgocal® 200-600

Albendazol 600 mg/Prazicualtel 100 mg

Albendazol 200 mg/Prazicualtel 30 mg

Antihelmintico y giardicida de amplio espectro



## Mikomax®

Ketoconazol 200 mg

Antimicótico de amplio espectro



## Saniderm®

Clotrimazol, Gentamicina, Betametasona, Óxido de Zinc.



**Ellos se merecen  
lo mejor**



# Descensor® Vet



Doxiciclina 200 mg

Antibiótico de amplio espectro y efecto inmunomodulador.



**Tetraciclina mejorada en absorción, espectro  
y como antidegradante tisular**

- ***Ideal para infecciones a corto plazo o de terapia extendida.***
- ***Tetraciclina más segura en tratamientos de animales jóvenes.***
- ***Su biodisponibilidad por vía oral mejora con el alimento***





# Saniderm®

Clotrimazol, Gentamicina, Betametasona, Óxido de Zinc.



**Crema Antimicótica, antibacteriana,  
antiinflamatoria, antialérgica y cicatrizante**

- **Protege integralmente la primera barrera de defensa; la piel.**
- Tratamiento complementario y de etiología desconocida.
- Recupera y cicatriza rápidamente la piel





**California<sup>®</sup>**

**A la Vanguardia de la salud animal**



