



Vademécum



BETA STREP

Penicilina Sódica - Procaína - Estreptomicina - Dexametasona

INDICACIONES: Potente antiinflamatorio esteroideo y antibiótico de amplio espectro. Indicado en infecciones causadas por bacterias sensibles a la Penicilina y Estreptomicina, acompañadas de procesos inflamatorios.

Presentaciones:

DOSIS: 1 mL/20 kg de peso, vía IM profunda cada 24 horas, mínimo por 3 días. No utilizar en hembras en gestación.

PRESENTACIONES:

Frasco por 3 M.U.I.

Frasco por 6 M.U.I.



CEFTIOVET

Ceftiofur Sódico 5%

INDICACIONES: En Equinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Streptococcus zooepidemicus*. En Bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica*, *P. multocida* y *Histophilus somni* y para infecciones podales causadas por *Fusobacterium necrophorum* y *Prevotella melanogingica*. En Porcinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Streptococcus suis*. En perros para el tratamiento de infecciones del tracto urinario causadas por *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* e infecciones de otros sistemas causados por *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.* y *E. Coli*.

DOSIS: Bovinos: 1-2 mg/kg de peso. Equinos: 2-4 mg/kg de peso. Porcinos: 3-5 mg/kg de peso. Caninos: 2 mg/kg de peso, vía subcutánea.

PRESENTACIONES:

Frasco por 1 g - Diluente de 20 mL



KYROOPEN® LA

Penicilina Benzatínica - Procaína - Sódica

INDICACIONES: Combinación antibiótica de acción rápida, sostenida y prolongada. Indicada en Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Perros y Gatos para el tratamiento del Carbón bacteridiano, Carbón sintomático, Neumonía, Tétanos, Abscesos, Mastitis, Papera equina y Necrobacilos.

DOSIS: 1 mL/18 kg (17.500 UI/Kg)

PRESENTACIONES:

Frasco por 2 M.U.I.

Frasco por 4 M.U.I.

Frasco por 6 M.U.I.

Frasco por 8 M.U.I.

Frasco por 10 M.U.I.

Frasco por 12 M.U.I.



MACROESPIRAN

Espiramicina 13 millones U.I.

INDICACIONES: Terapia antibiótica específica para el tratamiento de la MASTITIS de origen infeccioso, causada por bacterias Gram Positivas y Mycoplosmos sensibles o lo Espiramicina, la cual también se difunde al tejido pulmonar, reproductivo y sistema locomotor.

DOSIS: 1 mL/14 kg - Terneros, Porcinos y Ovinos: 1 mL/8-10 kg.

PRESENTACIONES:

Frasco por 13 M.U.I.



MAC-TYLO 200

Tilosina 20%

INDICACIONES: Antibiótico de gran eficacia terapéutica y confiabilidad en el tratamiento de Neumonías, Pododermatitis, Mastitis, Metritis y *Mycoplasma sp.* En Porcinos, se recomienda en Disentería Porcina, Artritis, Neumonía y en Erisipela.

DOSIS: 1 mL/20 kg vía IM profundo, cada 24 horas por 5 días.

PRESENTACIONES:

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 250 mL



MASTISHOT® RTU

Espiramicina 60 millones de U.I./100 ml

INDICACIONES: En Bovinos, Ovinos, Caprinos Y Porcinos para el tratamiento de mastitis, metritis, neumonías y cojeras.

DOSIS: En Bovinos adultos: 1 mL/20 kg - En Terneros, Porcinos, Ovinos, Caprinos: 1 mL/10 kg.

PRESENTACIONES:

Frasco por 25mL

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 250 mL



RESVIRADOL

Ceftiofur Clorhidrato

INDICACIONES: En Bovinos para el tratamiento de las enfermedades respiratorias causadas por *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* y *Pasteurella multocida*, Necrobacílosis interdigital o mal de pezuña, producida por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus* e infecciones reproductivas causadas por gérmenes sensibles al ceftiofur. En Porcinos para el tratamiento de las enfermedades respiratorias causadas por *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella cholera suis* y *Streptococcus suis* y colibacílosis causada *E. coli*.

DOSIS: En Bovinos: 1-2 mg/kg de peso vía intramuscular, cada 24 horas por 3-5 días (1 mL/25-50 kg de peso). En Porcinos: 3-5 mg/kg de peso vía intramuscular por 3 a 5 días (1 mL/10-17 kg de peso).

PRESENTACIONES:

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL



SULFAGAN

Sulfadiazina 40% - Trimetoprim 8%

INDICACIONES: Combinación antibiótica de amplio espectro, indicado en Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Perros, para el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales y podales.

DOSIS: 1 mL/cada 16 - 30 kg de peso, vía intramuscular. Cada 24 horas, por 5 días.

PRESENTACIONES:

Caja por 15 Fcos. por 10 mL

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL



Cefapirina Benzatínica

INDICACIONES: Cefolosporina de primera generación para el tratamiento de Endometritis en hembras bovinas útil en vacas repetidoras.**DOSIS:** A través del cervix, depositar el contenido de la jeringa a nivel uterino. En caso de ser necesario, repetir la aplicación 1 a 2 semanas después a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda aplicar a partir de la tercera semana pos-parto y en vacas repetidoras 24 horas después de la inseminación.**PRESENTACIONES:**

Tubo por 10 jeringas por 19 g



ANKOFEN®

Ketoprofeno 10%

INDICACIONES: En el tratamiento de lesiones músculo-esqueléticas e inflamaciones por heridas o traumatismos. Útil además en cólico Equino y en dolor visceral en otras especies.**DOSIS:** Bovinos y Porcinos: 3 mL/ 100 kg. Equinos: (I.V.) 1 mL/ 45 kg. Perros y Gatos: 0.5 mL/ 25 kg**PRESENTACIONES:**

Caja por 15 Fcos. por 10 mL

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL



ANKOFEN® POMADA


Ketoprofeno - Menta - Alcanfor - Guayacol - Salicilato De Metilo - Trementina

INDICACIONES: Especialmente útil en el control de la inflamación y dolor de músculos, tendones, huesos y articulaciones en todas las especies. Triple acción tópica. Único con Ketoprofeno, potente antiinflamatorio no esteroidal. Ideal en procesos inflamatorios de la ubre.**MODO DE EMPLEO:** Aplicar tópicamente sobre la zona afectada; repetir de 2 a 3 veces al día.**PRESENTACIONES:**

Tarro por 60 g

Tarro por 250 g

Tarro por 400 g



DYNABOLIN 50

Undecilenato de Boldenona 5%

INDICACIONES: Anabólico para uso en Bovinos, Equinos, Porcinos y Perros, como coadyuvante en la convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, debilidad senil, raquitismo, osteomalacia y consolidación de fracturas.**DOSIS:** En Bovinos, aplicar vía intramuscular 1 mL/ 90 kg de peso. En Perros vía intramuscular 0.5 mL por cada 10 kg.**PRESENTACIONES:**

Frasco por 50 mL



BRIMAX

Irgasan 0.5%

INDICACIONES: Shampoo antiséptico, indicado para la limpieza de la piel y el pelaje de los animales domésticos**DOSIS:** Mojar abundantemente el pelaje, aplicar una buena cantidad de shampoo y masajear hasta producir suficiente espuma. Enjuagar con agua, hasta retirar el producto en su totalidad.**PRESENTACIONES:**

Frasco por 250 mL

Frasco por 500 mL

Frasco por 2000 mL



COMPLEMIL 500®

Vitamina B12 - B1 - B6

INDICACIONES: Estimula el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos, favoreciendo la rápida recuperación de animales débiles y agotados.

Acción hemotopoyética

DOSIS: Bovinos y Equinos adultos: 3 - 5 mL. Potros y Terneros: 2 - 3 mL. Ovinos y Porcinos: 1 - 2 mL. Perros y Gatos: 0.5 - 1 mL.**PRESENTACIONES:**

Caja por 15 Fcos. por 10 mL

Caja por 9 Fcos. por 30 mL

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 250 mL

Frasco por 550 mL



KAVITAL

Vitamina K3 - Vitamina C

INDICACIONES: En Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Perro y Gatos, para el tratamiento de las deficiencias de la vitamina C y K y el consecuente síndrome hemorrágico causado por hipoprothrombinemia; en Bovinos como coadyuvante en el tratamiento de la hematuria Bovina.**DOSIS:** 1 mL/ 20 kg de peso por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa.**PRESENTACIONES:**

Caja por 6 Fcos. por 20 mL



KYROFOSFAN® NF

Toldimfós Sódico - Yodo - Selenio - Manganeso - Zinc - Ácido Nicotínico

INDICACIONES: Solución activadora del metabolismo orgánico, favorece la liberación de hormonas y mejora el comportamiento reproductivo de machos y hembras. Indicado como coadyuvante en animales en anestro y en planes de tecnologías reproductivas como Inseminación Artificial, IATF y Transferencia de Embriones.**DOSIS:** 1 mL/ 20 kg intramuscular.**PRESENTACIONES:**

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 250 mL

Frasco por 500 mL





KYROCUR®

Fenbendazol 10%

INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro en Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos para el control y tratamiento de nemátodos gastrointestinales pulmonares y tenias. En equinos para el control y tratamiento de nemátodos gastrointestinales y pulmonares.

DOSIS: 1 mL/20 kg de peso. Equinos 7.5 mL/100 kg de peso.

PRESENTACIONES:

- Caja por 24 Fueles por 20 mL
- Frasco por 100 mL
- Frasco por 500 mL
- Frasco por 1000 mL
- Frasco por 2000 mL



KYROMEC® HORSE

Ivermectina - Praziquantel

INDICACIONES: Suspensión oral parasitida de amplio espectro para Equinos, eficaz contra parásitos redondos, tenias y fases larvarias migratorias y con localización gástrica.

DOSIS: 1.07 g de producto dosis suficiente para tratar 100 kg de peso vivo, en la práctica, la jeringa de 6.42 g sirve para tratar un Equino de 600 kg.

PRESENTACIONES:

- Jeringa por 6.42 g



TOLCOX

Toltrazuril 5%

INDICACIONES: Suspensión oral indicado para el control y tratamiento de la coccidiosis ocasionado por *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria labradoriensis* e *Isospora sp.*

DOSIS: Administrar vía oral en Porcinos en el día 3-5 día de vida 1mL/2.5Kg. En Bovinos administrar una dosis única de 3mL/10Kg.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 50 mL
- Frasco por 100 mL
- Frasco por 250 mL
- Frasco por 500 mL
- Frasco por 1 Litro



KYROMEC® 1%

Ivermectina 1%

INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro, indicado en el control de parásitos externos como garrapatas, ácaros, gusanera y nuche, e internos como parásitos pulmonares y gastrointestinales.

DOSIS: Administrar vía subcutánea. Bovinos: 1 mL/50 kg de peso. Porcinos: 1 mL/33 kg de peso.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 20 mL
- Frasco por 50 mL
- Frasco por 100 mL
- Frasco por 200 mL
- Frasco por 500 mL



KYROMEC® ATOM

Ivermectina L.A. 3.15%

INDICACIONES: Solución inyectable, con un vehículo de lenta liberación y larga acción, que controla parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos como garrapatas, gusanera, nuche y ácaros de la sarna en Bovinos.

DOSIS: 1 mL/50 kg de peso, vía subcutánea.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 20 mL
- Frasco por 50 mL
- Frasco por 200 mL
- Frasco por 500 mL
- Frasco por 1000 mL



KYROMECTINA PROLONGER

Doramectina 1%

INDICACIONES: Control de parásitos internos y externos en Bovinos y Porcinos, con alto margen de seguridad. Especial acción en parásitos como garrapatas de un solo huésped, gusanera y nuche.

DOSIS: En Bovinos aplicar 1 mL/50 kg vía intramuscular y subcutánea. En Porcinos 1 mL/33 kg vía intramuscular.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 50 mL
- Frasco por 250 mL
- Frasco por 500 mL
- Frasco por 1 Litro



BABENIL®

Diaceturato de Diminazene 7% - Antipirina 37.5%

INDICACIONES: Hemoparásitida concentrado, indicado en el tratamiento de Babesiosis y Tripanosomosis (Fiebre de garrapata, ranilla roja o secadera). Útil en papilomatosis.

DOSIS: 1 mL/20 kg de peso.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 20 mL
- Frasco por 50 mL
- Frasco por 100 mL
- Frasco por 250 mL



HEMAPLUS®

Diaceturato de Diminazene 3.5% - Oxitetraciclina 7% - Antipirina 18%

INDICACIONES: Indicado en Bovinos, Equinos, Ovinos y Perros para el tratamiento de enfermedades causadas por hemoparásitos como Anaplasmosis, Babesiosis y Tripanosomosis (Ranilla blanca, Ranilla roja y Renquera).

DOSIS: 1 mL/10 kg de peso.

PRESENTACIONES:

- Frasco por 30 mL
- Frasco por 50 mL
- Frasco por 100 mL



IMIDOPAR

Imidocarb 15%

INDICACIONES: En Bovinos para el tratamiento y control de Babesiosis causada por *Babesia bovis*, *Babesia bigemina*, Anaplasmosis causada por *Anaplasma marginale*. En Equinos y Perros para el tratamiento de Babesiosis causada por *Theileria equi* y *babesia canis*.

DOSIS: En Bovinos para Anaplasmosis 10 mL/500kg de peso y para Babesiosis 4 mL/ 500kg. En Equinos 5 mL/310 kg de peso. En Perros 0.2 mL por cada 5-15kg de peso.

PRESENTACIONES:

Frasco por 10 mL

Frasco por 100 mL

BAÑADOR

Ethion 100%

INDICACIONES: Organofosforado de aplicación externa para el control de garrapatas, moscas y piojos.

MODO DE PREPARACIÓN: Disolver 15 mL de Bañador por cada 20 litros de agua. Agita y bañar los animales con 1 litro de preparación por cada 100 kg de peso vivo.

PRESENTACIONES:

Caja por 12 Fcos. por 30 mL

Frasco por 235 mL

Frasco por 1000 mL



CITRAZ®

Amitraz 20.8% - Citronella 1%

INDICACIONES: En Bovinos para el control de las garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense*.

MODO DE PREPARACIÓN: Mezclar 20 mL de Citraz por cada 20 litros de agua. Aplicar 1 litro de la preparación por cada 100 kg de peso vivo.

PRESENTACIONES:

Caja por 12 Fcos. por 20 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 500 mL

Frasco por 1000 mL



ANKOFEN® TABLETAS

Ketoprofeno 20 mg

INDICACIONES: Antiinflamatorio, analgésico, antipirético no esteroide para Perros y Gatos. Para el tratamiento de procesos inflamatorios de origen no infeccioso y como coadyuvante en procesos postquirúrgicos de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético, artrosis, traumatismos, luxaciones, esguinces, artritis y edemas.

DOSIS: Vía oral, administrar una tableta por cada 20 kg de peso (1 mg de ketoprofeno/kg cada 24 horas) preferiblemente durante las comidas. La duración del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Blíster por 10 tabletas



CANPLUSVIT®

Sulfato feroso - Vitamina B12, B6 y B1 - Aminoácidos

INDICACIONES: Estimula el metabolismo energético y músculo-esquelético. Coadyuvante en estados anémicos y de desnutrición leve a severa, después de parasitismos intensos, especialmente por *Ancylostoma caninum*. Ideal para recuperación por *Erlichiosis*.

DOSIS: Vía oral, 1mL/kg de peso. La frecuencia del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco por 50 mL

Frasco por 120 mL



PARACANIS

Embonato de Pirantel 72.5 mg/ml - Praziquantel 25mg/ml

INDICACIONES: En Perros y Gatos para el tratamiento de las infestaciones parásitarias ocasionadas por los principales parásitos internos, incluyendo tenia.

DOSIS: 1 mL/ 5 kg de peso. Repetir el tratamiento a las 3 semanas.

PRESENTACIONES:

Jeringa por 2 mL

Jeringa por 5 mL

Jeringa por 10 mL



PARACANIS® NF

Ivermectina 0.25 mg/ml - Embonato de Pirantel 74 mg/ml - Praziquantel 25mg/ml

INDICACIONES: Completa asociación antihelminítica para Perros y Gatos, garantizando el control de las infestaciones por nemátodos, tenias y larvas de *Dirofilaria immitis* (Gusano del Corazón).

DOSIS: 1 mL/ 5 kg de peso. Repetir el tratamiento a las 3-4 semanas.

PRESENTACIONES:

Jeringa por 2 mL

Jeringa por 5 mL

Jeringa por 10 mL



PARACANIS® PUPPY

Pamoato de Pirantel 80 mg/ml

INDICACIONES: En Cachorros para el control y tratamiento de las infestaciones ocasionadas por *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara canis*.

DOSIS: Administrar vía oral, 0,5 mL en animales menores de 2.5 kg y en animales mayores de 2.5 kg, 1 mL por cada 5 kg de peso.

La frecuencia de administración es a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Jeringa por 2 mL

Jeringa por 5 mL





KYRO-RAT® SB Brodifacouma al 0.005%

INDICACIONES: Cebo rodenticida con potente acción anticoagulante que produce la muerte de ratas y ratones 2 a 3 días después de la ingestión de una sola dosis. No ocasiona recelo o advertencia en la colonia de roedores.

DOSIS: Colocar la cantidad suficiente en los sitios frecuentados por los roedores.

PRESENTACIONES:

Caja por 30 sobres por 20 g

Caja por 20 sobres por 50 g

Bolsa por 2.5 kg



FIPET® SPRAY Fipronil 2.5%

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de pulgas, garrapatas y piojos en Perros y Gatos. Coadyuvante en el tratamiento de infestaciones por ácaros. Coadyuvante en el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP) en Perros.

DOSIS: Con el frasco 50 y 100 mL: 6 a 12 aspersiones/kg de peso. Con el frasco 250 mL: 4 a 8 aspersiones/kg de peso.

PRESENTACIONES:

Frasco por 50 mL

Frasco por 100 mL

Frasco por 250 mL



ANKOFEN® GOTAS Ketoprofeno 2%

INDICACIONES: En Perros y Gatos para el tratamiento de los estados dolorosos e inflamatorios de origen no infeccioso de los sistemas osteoarticulares y músculo esquelético, artrosis, traumatismos, luxaciones, esguinces, dolor posquirúrgico, artritis y edemas.

DOSIS: Administrar por vía oral 3 gotas/2kg de peso al día (1 mg/kg). La duración del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco gotero por 10 mL



FLEXIGEL®

Glucosamina HCl 500 mg - Condroitina Sulfato 300 mg

INDICACIONES: Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis, en las enfermedades articulares por degeneración del cartílago que las recubre, en el tratamiento postoperatorio de la displasia de cadera en Perros y Gatos.

DOSIS: Perros y Gatos hasta 10 kg de peso: 1 cápsula diaria. Perros de 11 a 20 kg de peso: 2 cápsulas diarias. Dividir la dosis a mañana y noche. Perros de 21 a 50 kg de peso: 3 cápsulas diarias. Dividir la dosis a mañana y noche. Perros mayores de 50 kg: 4 cápsulas diarias. Dividir la dosis a mañana y noche.

PRESENTACIONES:

Caja por 10 Cápsulas blandas de gelatina.



OMEGEL®

Ácido Linoléico - Ácido Linolénico - Glucosamina - Condroitina

INDICACIONES: En Perros y Gatos como suplemento alimenticio a base de ácidos grasos: Omega 3, Omega 6, combinados con glucosamina y condroitina para mejorar el estado general del pelo y la piel de los animales, así mismo como suplemento alimenticio para mejorar la movilidad y flexibilidad de las articulaciones.

DOSIS: Perros y Gatos. Menores de 10 kg de peso: 1 cápsula diaria. De 11 a 30 kg de peso: 2 cápsulas diarias. De 31 a 60 kg de peso: 3 cápsulas diarias. Mayores de 60 kg de peso: 4 cápsulas diarias.

PRESENTACIONES:

Caja por 10 Cápsulas blandas de gelatina



EDEMASTIN®

Furosemida 5% y Dexametasona 0.05%

INDICACIONES: En Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos, Perros y Gatos como diurético y antiinflamatorio.

DOSIS: Aplicar vía intramuscular. Bovinos y Equinos: 1 mL/50 Kg. Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 mL/20 Kg. Perros y Gatos: 0.5 a 1 mL/ 10 Kg. Duración y frecuencia a criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco por 20 mL

Frasco por 50 mL



LEVAN FORT® Solución energética hidratante

INDICACIONES: En Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Perros en el tratamiento de las deficiencias de los elementos presentes en la composición: deshidratación, cefosis y como coadyuvante en la recuperación de enfermedades infecciosas y parasitarias. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

DOSIS: Aplicar vía intravenosa. Bovinos y Equinos adultos de 300-500 Kg: 1.000 a 2.000 mL. Bovinos y Equinos jóvenes de 200-300 Kg: 500 mL. Perros: 10-100 mL. Porcinos y Ovinos adultos de 150-200 Kg: 200-500 mL. Porcinos, Ovinos jóvenes y Perros de 50-150 Kg: de 20-100mL.

PRESENTACIONES:

Frasco por 500 mL

Acompañado de vial de Vitamina B12 por 3 mL



METABOGAN®

Vitaminas, Aminoácidos, Minerales, Electrolitos y Ácidos grasos

INDICACIONES: Estimulante del metabolismo orgánico en Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

DOSIS: Aplicar vía intramuscular profunda o subcutánea. Bovinos: 1 mL por cada 50 Kg de peso repetir cada 6 meses. Terneros: Despues del destete. Toros: Cada 30 días. 3 aplicaciones. Bovinos de Ceba: Cada 60 días. 3 aplicaciones. Animales convalecientes: Cada 8 días. 4 aplicaciones. Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 20 Kg. de peso cada 60 días 3 aplicaciones.

PRESENTACIONES:

Frasco por 50 mL

Frasco por 250 mL

Frasco por 500 mL



PULVICAN® SHAMPOO EP

Permetrina 1%

INDICACIONES: Está indicado para la limpieza e higiene de la piel y el pelo de las mascotas y para el control de pulgas, garrapatas y piojos.

MODO DE EMPLEO: Humedecer completamente el animal y frotar el shampoo hasta obtener espuma. Dejar actuar durante 3 minutos, luego enjuagar con abundante agua, secar y cepillar.

PRESENTACIONES:

Frasco por 120 mL



PULVICAN® JABÓN EP

Permetrina 1%

INDICACIONES: Limpieza e higiene de la piel y pelo, control de pulgas, garrapatas y piojos en Perros y Gatos.

MODO DE EMPLEO: Humedecer completamente el animal y frotar el jabón hasta obtener espuma. Dejar actuar durante 5 minutos, luego enjuagar con abundante agua, secar y cepillar.

PRESENTACIONES:

Barra 90g



PULVICAN® SHAMPOO FM

Triclorocarbán 0.2%

INDICACIONES: Para la limpieza, higiene y acondicionamiento del pelo y piel en mascotas.

DOSIS: Humedecer completamente el animal y frotar el shampoo hasta obtener espuma. Dejar actuar durante 3 minutos, luego enjuagar con abundante agua, secar y cepillar.

PRESENTACIONES:

Frasco por 120 mL



PULVICAN® BAÑO SECO FM

Triclorocarbán 0.2%

INDICACIONES: Se utiliza como antiséptico, desodorizante y aromatizante para Perros.

DOSIS: Espolvorear sobre el pelo frotándolo hasta que penetre en la piel. Despues de 3 minutos, cepillar bien.

PRESENTACIONES:

Frasco por 100 g



PULVICAN® COLONIA

Fragancia Náutica

INDICACIONES: Colonia aromatizante para mascotas.

DOSIS: Aplicar sobre el pelo, no aplicar cerca de los ojos y hocico.

PRESENTACIONES:

Frasco por 30 mL





Kyrovet Laboratories de Ecuador S.A.
Av. Reina Victoria N25-33
Edificio Banco Guayaquil, Piso 12, Oficina 1204
Tel.: (593) 095 997 4407
Quito - Ecuador
c.comercialecuador@kyrovet.com
www.kyrovet.com